


# 9 Les amphibiens

Les amphibiens sont des animaux qui vivent à la fois dans, et hors de, l'eau. Ils ont différentes stratégies de reproduction. Certains pondent des oeufs alors que d'autres donnent directement naissance à des bébés. On peut séparer les amphibiens en 2 groupes différents



## LES ANOURES




**LES GRENOUILLES VERTES:**  
LA GRENOUILLE DE LESSONA EST UNE ESPÈCE INDIGÈNE. LA GRENOUILLE RIEUZE A ÉTÉ INTRODUITE EN SUISSE DANS LES ANNÉES 50, SOIT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU POUR L'ÉLEVAGE (GRISSE DE GRENOUILLE). CES DEUX ESPÈCES PEUVENT S'ACCROÛLER POUR FORMER UN HYBRIDE LA GRENOUILLE VERTE.

**LA GRENOUILLE ROUSSE:**  
RANA TEMPORARIA TEMPORARIA APPARAÎT TRÈS VITE DANS L'EAU. PARFOIS MÊME AVANT QUE LA GLACE NE FONDE ELLE EST LA PREMIÈRE GRENOUILLE À PONDRE DANS L'ANNÉE. CHAQUE FEMELLE POND ENVIRON 2000 ŒUFS. LES TÊTARDS S'ÉLOIGNENT EN SUITE LA PRINCIPALE NOURRITURE POUR DE NOUVEAUX PRÉDATEURS DES ÉTANGS. ELLE HIBERNE DANS LA VASE AU FOND DES PLAN D'EAU.

**LE CRAPAUD COMMUN:**  
BUFO BUFO BUFO HIBERNE DANS LES TROUS DU SOL. IL NE QUITTE SA CACHETTE EN ÉTÉ QUE LE SOIR POUR CHASSER LES VERS ET LES INSECTES. LES MALES ATTEIGNENT LA MATURITÉ SEXUELLE ENTRE 3 ET 5 ANS. LES FEMELLES ENTRE 4 ET 7 ANS. LES CRAPAUDS MIGRENT À FIN MARS VERS LES PLANS D'EAU POUR SE REPRODUIRE. LORS DE LA MARCHÉ, LE MÂLE SE FAIT TRANSPORTER SUR LE DOS DE LA FEMELLE. SI UNE ROUTE COUPE LES VOIES DE MIGRATION, LA POPULATION PEUT ÊTRE ANÉANTIE EN QUELQUES ANNÉES

## LES URODÈLES



**LE TRITON ALBÊSTRÉ:**  
TRITURUS ALBÊSTRIS ALBÊSTRIS EST LE TRITON LE PLUS FRÉQUENT DE SUISSE. ON LE TROUVE JUSQU'À 2300 M D'ALTITUDE. IL APPARAÎT DANS L'EAU DE FÉVRIER À MAI. IL PEUT ATTENDRE 4 À 5 ANS EN LIBERTÉ. ON LE TROUVE PARFOIS EN COMPAGNIE DU TRITON PALMÉ, TRITURUS HELVETICUS HELVETICUS.

**LA SALAMANDRE TACHETÉE:**  
SALAMANDRA TACHETATA TERRESTRIUS QUITTE SA CACHETTE LES NUITS HUMIDES POUR CHASSER LES VERS ET LES INSECTES LENTS. ELLE POSSÈDE UN VENIN TRÈS PUISSANT QU'ELLE ÉMET PAR LES GLANDES SITUÉES SUR SON COU. L'ACCROÛLEMENT A LIEU EN SAISON CHAUDE SUR TERRE FERME. LA SALAMANDRE PEUT ATTENDRE 9 ANS EN LIBERTÉ.

**Les anoures**  
Ce sont des amphibiens dont les jeunes sont différents des adultes. Les têtards se métamorphosent, perdent leur queue, développent des pattes pour devenir des adultes

**Les urodèles**  
Ce sont des amphibiens dont les jeunes sont comme des adultes en miniature. Ils ne subissent pas de métamorphose.

